


# بعد تحصين الطفل

## حار جدا




↑ 39°C



درجة الحرارة اكثر من 39 إتصل هاتفيا بطبيبك

## حمراء او متورمة

حمراء او متورمة في  
موقع الحقن




ضعوا قماش بارد ورطب على الموقع  
لا تدلك الموقع



عليكم ان تعطوهم الشراب  
(المياه او الارضاع من الثدي)

عليكم ان تسهلوا  
ملابسهم

## نعسان أو يرفض تناول الطعام



المولود نعسان أو يتناول طعامه ببطئ  
عليكم مراقبتهم بعناية



عليكم ان تقومو بتشجيعهم  
على الشرب



## البكاء




المولود غير مرتاح أو حاد الطبع  
أو يبكي أو يعاني من الحمى



أعطوهم باراسيتامول وفقا  
لما اشارت اليه الممرضة

عليك ان تعطيهم  
كثير من الحضنات



## الآثار الجانبية الشائعة

قيء



انتفاخ الغدد



ططفح -5  
12 أيام



## القلق



قوموا بعلاج الآثار الجانبية كما هي مبينة  
في هذه النشرة أو إذا كنتم تخشون فاتصلوا  
بطبيبكم أو الممرض بالهاتف و قولوا لهم  
اللقاح والاعراض

