


# बच्चालाई खोप लगाएपछि

## निकै तातो



उनीहरूलाई कुनै झोल पदार्थ दिनुहोस् (पानी वा आमाको दूध)


उनीहरूको लुगा खुकुलो पारिदिनुहोस्



तापक्रम ३९°C से भन्दा बढी भएमा तपाईंको डाक्टरलाई फोन गर्नुहोस्


## रातो भएमा वा सुन्निएमा

सुई लगाएको ठाउँमा रातो भएमा वा सुन्निएमा



सो ठाउँमा भिजेको चिसो कपडा राख्नुहोस् सो स्थानमा नरगड्नुहोस्

## निदाउन खोजेमा वा केही नखाएमा



बच्चा निदाउन खोजेमा वा खुवाई सुस्त भएमा उनीहरूलाई ध्यानपूर्वक निगरानी गर्नुहोस्




उनीहरूलाई तरलपदार्थ पिउन प्रोत्साहित गर्नुहोस्



## रुवाई



बच्चा अशान्त भएमा, असजिलो महसुस गरेमा, रोइरहेमा वा ज्वरो आएमा उनीहरूलाई नर्सको सल्लाह अनुसारको पारासिटामोल (औषधी) दिनुहोस्



उनीहरूलाई धेरै पटक अंगालोमा राख्नुहोस्

## सामान्य दुष्प्रभावहरु(नराम्रो असरहरु)



बान्ता

ग्रन्थीहरु सुन्निते



डाबर ५-१२ दिन

## चिन्तित

बच्चाको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ ? तपाईंको नर्सलाई, डाक्टरलाई वा अस्पतालामा फोन गर्नुहोस्

